

## Liste de vérification pour la prescription d'Addyi® (flibansérine)

Avant de prescrire Addyi (flibansérine), le professionnel de la santé doit envisager d'utiliser la liste de vérification pour la prescription comme outil pour confirmer l'admissibilité de la patiente au traitement. Si la patiente est jugée admissible, il faut obtenir son consentement éclairé conformément à la législation et à toute norme ou directive provinciale ou territoriale.



### À propos d'Addyi :

Addyi est indiqué pour le traitement du trouble généralisé et acquis lié à la baisse du désir sexuel (TBDS) chez les femmes préménopausées, caractérisé par une diminution de la libido depuis au moins 6 mois, qui survient 75-100 % du temps et cause une souffrance psychologique marquée ou des problèmes relationnels, et qui n'est pas attribuable à:

- un problème concomitant de nature médicale ou psychiatrique,
- des problèmes au sein de la relation, ou
- des effets d'un médicament ou d'une autre substance pharmacologique.

### Addyi ne doit pas être prescrit aux patientes qui ont répondu NON aux questions 1 à 5

1. Auparavant, le niveau de désir ou d'intérêt sexuel de la patiente était-il bon et satisfaisant pour elle?  Oui  Non
2. Y a-t-il eu une diminution du niveau de désir ou d'intérêt sexuel de la patiente  Oui  Non
3. Le désir sexuel a-t-il été diminué pendant plus de 6 mois, 75-100% du temps?  Oui  Non
4. Est-ce que la patiente est dérangée par la diminution de son niveau de désir ou d'intérêt sexuel ?  Oui  Non
5. Est-ce que la patiente aimerait que son niveau de désir ou d'intérêt sexuel augmente?  Oui  Non

### Il faut faire preuve de jugement clinique si l'on prescrit Addyi à des patientes qui ont répondu OUI à l'une des questions ci-dessous, car un diagnostic primaire autre que le TBDS pourrait être présent.

1. Y a-t-il des facteurs qui pourraient contribuer à sa diminution actuelle du désir ou de l'intérêt sexuel ?
  - A. Une opération, une dépression, des blessures ou tout autre problème de santé  Oui  Non
  - B. Médicaments (ex. ISRS), drogues ou quantité d'alcool prise actuellement  Oui  Non
  - C. Accouchement récent, symptômes de la ménopause  Oui  Non
  - D. Autres problèmes sexuels possibles (douleur, diminution de l'excitation| ou de l'orgasme)  Oui  Non
  - E. Les problèmes sexuels de son partenaire  Oui  Non
  - F. Insatisfaction à l'égard de sa relation ou de son partenaire  Oui  Non
  - G. Stress ou fatigue  Oui  Non

**Contre-indications à la prescription d'Addyi**  
**Addyi ne doit pas être prescrit aux patientes qui ont répondu OUI aux questions ci-dessous.**

1. Est-ce que la patiente souffre d'insuffisance hépatique ?  Oui  Non
2. Est-ce que la patiente est enceinte ou allaite ?  Oui  Non
3. Est-ce que la patiente consomme actuellement de l'alcool et a une tension artérielle systolique au repos de <110 mmHg ou une tension artérielle diastolique <60 mmHg ?  Oui  Non
4. Est-ce que la patiente prend des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 ?  
Voici quelques exemples d'inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 :  
ritonavir, fluconazole, ciprofloxacine, érythromycine, boceprevir, nafazone et jus de pamplemousse.  
Veuillez consulter la monographie de produit d'Addyi pour de plus amples renseignements.  Oui  Non
5. Est-ce que la patiente a une hypersensibilité à la flibansérine ou à d'autres composants d'Addyi?  Oui  Non

**Conseils aux patients pour une utilisation sécuritaire d'Addyi**  
**Les patientes doivent être conseillées sur la façon de prendre Addyi afin de favoriser l'utilisation sécuritaire du médicament**

1. Addyi est administré à l'heure du coucher parce que lorsqu'il est administré pendant les heures de réveil, il augmente les risques d'hypotension, de syncope et de dépression du SNC (comme la somnolence et la sédation).  Complété
2. L'importance de limiter sa consommation d'alcool en association avec Addyi, car l'association d'Addyi et d'alcool peut augmenter le risque d'hypotension artérielle grave.  Complété
3. Il faut déconseiller à la patiente de conduire un véhicule, d'utiliser des machines ou de s'adonner à des activités qui exigent d'avoir les pensées claires pendant les 6 heures suivant la prise d'Addyi et jusqu'à ce qu'elle sache comment cela pourrait l'affecter.  Complété
4. Si la patiente oublie de prendre une dose, on doit lui indiquer de sauter cette dose et de prendre sa prochaine dose au coucher le jour suivant. L'augmentation des doses n'est pas associée à un effet plus important et peut augmenter les risques d'effets secondaires.  Complété
5. Addyi doit être utilisé avec prudence chez les patientes présentant des troubles cardiovasculaires préexistants. Les effets secondaires de l'utilisation d'Addyi comprennent la tachycardie, les palpitations, l'hypotension et la syncope.  Complété
6. La patiente doit être avertie que ce ne sont pas toutes les femmes qui bénéficient du traitement avec Addyi. Le traitement doit être discontinué après 8 semaines s'il n'y a pas eu d'amélioration.  Complété
7. La patiente donne son consentement au traitement par Addyi.  Consentement
8. La patiente a reçu une copie des « Renseignements sur le médicament à l'intention du patient  Complété

**Pour en savoir plus, veuillez consulter la monographie de produit d'Addyi**