

Mises en garde et précautions importantes

- Pendant que vous prenez ADDYI, vous pourriez avoir de l'hypotension, des évanouissements et de la somnolence
- Ces effets secondaires sont plus susceptibles de se produire si :
 - Vous consommez de l'alcool
 - vous prenez certains médicaments, des suppléments à base de plantes médicinales ou du jus de pamplemousse
- Prenez ADDYI au coucher; ADDYI peut causer la sédation et la somnolence
- Vous devez attendre au moins six heures après avoir pris ADDYI avant de conduire un véhicule ou de faire fonctionner des machines
- Ne prenez pas ADDYI si vous avez des problèmes de foie

Pourquoi utilise-t-on ADDYI?

ADDYI est utilisé dans le traitement du trouble lié à la baisse du désir sexuel chez les femmes pré- et naturellement ménopausées âgées de 60 ans ou moins qui n'ont jamais présenté une faible libido dans le passé et qui ont une faible libido, peu importe le type d'activité sexuelle, la situation ou le partenaire sexuel.

ADDYI n'améliore pas la performance sexuelle.

Que dois-je faire si j'éprouve une sensation de tête légère ou si j'ai des étourdissements?

- Étendez-vous immédiatement.
- Consultez un médecin sans tarder ou demandez à quelqu'un d'obtenir une aide médicale immédiate si vos symptômes ne disparaissent pas ou si vous vous évanouissez (si vous perdez connaissance).
- Informez votre professionnel de la santé dès que possible en cas d'évanouissement.

Comment prendre ADDYI?

- Prenez ADDYI exactement comme vous l'a prescrit votre médecin.
- Au coucher uniquement.
- Si vous avez oublié une dose, sautez la dose omise et prenez votre prochaine dose au coucher le lendemain.
- Limitez la quantité d'alcool que vous consommez pendant que vous prenez ADDYI.
- Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les suppléments naturels.

ADDYI ne doit pas être utilisé si :

- vous avez des problèmes de foie;
- vous êtes enceinte ou vous allaitez;
- vous faites de l'hypotension et consommez de l'alcool;
- vous avez moins de 18 ans ou plus de 60 ans;
- vous prenez un médicament appelé digoxine ou un médicament similaire.